

CELIACHIA

RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO



L'ICEBERG EPIDEMIOLOGICO

La celiachia è oggi una patologia ad alta diffusione, ma ancora in larga parte sommersa.

In Italia:

~280.000 casi diagnosticati
+14.000 nuove diagnosi/anno
~400.000 casi non identificati



Difficoltà diagnostica

Molti pazienti non presentano sintomi tipici: manifestazioni extraintestinali o forme silenziose rendono la diagnosi più laboriosa e spesso tardiva.

DIAGNOSI DELLA CELIACHIA: COME È CAMBIATA?



CLICCA PER LEGGERE
[l'articolo sulle ultime linee guida ESsCD](#)

- 1 Test sierologici affidabili (anti-TG2)
- 2 Dosaggio IgA totali per evitare falsi negativi
- 3 Biopsia evitabile nei bambini selezionati

Screening pediatrico

I dati italiani dimostrano che lo screening è fattibile, ben accettato e utile per identificare precocemente i casi non diagnosticati.

ETICHETTATURE ALIMENTARI

La dicitura "può contenere" segnala un rischio teorico di contaminazione, ma il suo uso non sempre rispecchia il rischio reale.

Il paradosso

Un utilizzo non sempre appropriato può limitare inutilmente la dieta e generare sfiducia.



Una nuova direzione

Il quadro normativo si sta orientando verso una maggiore standardizzazione, basata su soglie di sicurezza validate scientificamente.

*Riconoscere precocemente la celiachia significa **prevenire complicanze e migliorare la qualità di vita.***

Approfondimenti



Relazione annuale al Parlamento sulla celiachia: spunti per un nuovo modello di diagnosi e di prevenzione